

**Сроки развития и величина личинок некоторых видов мух,
обнаруживаемых на трупe в условиях умеренного климата
(летний период), по Schranz**

Вид мухи	Musca domestica	Callifora vomitoria	Lucilia caesar	Sarcophaga cranaria	Pyophilina nigriceps
Продолжительность развития яиц при 20°C	10-12 ч	12-16 ч	12-16 ч	живородящая (vivipara)	10-12 ч
Дни	Д л и н а л и ч и н о к , м м				
2-й	2	3-4	2	3-4	1
3-й	2-3	5-6	2-3	5-6	2-3
4-й	4-5	7-8	3-4	7-9	4-5
5-й	6-7	10-12	5-6	10-12	5-6
6-й	7-8	13-14	7-8	13-14	окукливание
7-й	8	окукливание	8-9	15-16	куколка 3-4мм
8-й	окукливание	куколка 9-10мм	окукливание	16-18	куколка 3-4мм
9-й	куколка 5-6мм	куколка 9-10мм	куколка 6-7мм	19-20	куколка 3-4мм
10-й	куколка 5-6мм	куколка 9-10мм	куколка 6-7мм	окукливание	муха 4-5 мм
12-й	куколка 5-6мм	куколка 9-10мм	куколка 6-7мм	куколка 10-12мм	
14-й	муха 7-8 мм	муха 12-13 мм	муха 7-9 мм	куколка 10-12мм	
16-й				куколка 10-12мм	
18-й				муха 16-18мм	



© Bobrov Nikita, MD, PhD, ÚSL LF UPJŠ Košice, Slovakia